

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo

Revisión de tercer ciclo (2021-2027)

DOCUMENTOS INICIALES

PROGRAMA, CALENDARIO, ESTUDIO GENERAL SOBRE LA DEMARCACIÓN Y FÓRMULAS DE CONSULTA

ANEJO 3

DOCUMENTO AUXILIAR

FICHAS DE INDICADORES DE CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA POR MASA DE AGUA

19 de octubre de 2018

Confederación Hidrográfica del Tajo O.A.



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
1	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo en Aranjuez
Código	ES030MSPF0101021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,21	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,02	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,28	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
2	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo desde Real Acequia del Tajo hasta A. de Embocador
Código	ES030MSPF0102021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,08	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,35	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,94	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
3	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo desde E. de Estremera hasta Ayo. del Álamo
Código	ES030MSPF0103021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,19	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,73	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
4	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Estremera
Código	ES030MSPF0104020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,54	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
5	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo desde E. Almoguera hasta E. Estremera
Código	ES030MSPF0105021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,56	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
6	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Almoguera
Código	ES030MSPF0106020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,53	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
7	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo desde E. Zorita hasta E.Almoguera
Código	ES030MSPF0107021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,07	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,58	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
8	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Zorita
Código	ES030MSPF0108020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,54	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
9	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Bolarque
Código	ES030MSPF0109020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,40	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,33	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
10	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Entrepeñas
Código	ES030MSPF0110020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,53	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
11	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo desde R. Ablanquejo hasta E. de Entrepeñas
Código	ES030MSPF0111010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
12	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo desde Ayo. de la Fuente hasta R.Ablanquejo
Código	ES030MSPF0112010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,10	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,11	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
13	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo desde confluencia R.Gallo hasta Ayo. Fuente
Código	ES030MSPF0113010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,67	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,67	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
14	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo desde Peralejos de las Truchas hasta R. Gallo
Código	ES030MSPF0114010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
15	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo desde nacimiento hasta Peralejos de las Truchas
Código	ES030MSPF0115010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
16	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo Salado hasta su confluencia con R. Tajo
Código	ES030MSPF0116010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
1,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,06	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,11	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
17	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Calvache hasta su confluencia con R. Tajo
Código	ES030MSPF0117010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,04	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
18	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de la Vega hasta R.Tajo
Código	ES030MSPF0118010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
19	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de Ompolveda hasta E. Entrepeñas
Código	ES030MSPF0119010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
20	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de la Solana hasta E. Entrepeñas
Código	ES030MSPF0120010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
21	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Barranco Grande hasta el E. Entrepeñas
Código	ES030MSPF0121010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
22	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Cifuentes hasta desembocadura en Río Tajo
Código	ES030MSPF0122010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
23	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo del Estrecho hasta su desembocadura en el Río Tajo
Código	ES030MSPF0123010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
24	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de Villanueva hasta desembocadura en Río Tajo
Código	ES030MSPF0124010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
25	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Barranco de la Hoz hasta desembocadura en Río Tajo
Código	ES030MSPF0125010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
26	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Ablanquejo hasta su desembocadura en el Río Tajo
Código	ES030MSPF0126010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
27	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Gallo desde Corduente hasta Río Tajo
Código	ES030MSPF0127010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
28	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Gallo desde su nacimiento hasta Corduente
Código	ES030MSPF0128010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
29	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Cabrillas hasta su desembocadura en el Río Tajo
Código	ES030MSPF0129010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
30	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Buendía
Código	ES030MSPF0131020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,53	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
31	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Guadiela desde R. Escabas hasta E. Buendía
Código	ES030MSPF0132010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,03	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,05	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,46	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,63	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
32	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Guadiela desde R. Alcantud hasta R. Escabas
Código	ES030MSPF0133010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,07	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,05	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,96	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,22	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
33	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Guadiela desde E. Molino de Chinchá hasta R. Alcántud
Código	ES030MSPF0134010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,09	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,10	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,34	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
34	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Guadiela desde nacimiento hasta E. Molino de Chinchá
Código	ES030MSPF0135010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,14	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,14	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,54	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
35	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Jabalera hasta E. Bolarque
Código	ES030MSPF0136010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,13	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,15	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
36	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Mayor desde su nacimiento hasta E. Buendía
Código	ES030MSPF0137010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,10	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,11	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
37	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Guadamajud hasta E. Buendía
Código	ES030MSPF0138010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
38	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de la Vega hasta E. Buendía
Código	ES030MSPF0139010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
39	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Garigay hasta E. de Buendía
Código	ES030MSPF0140010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
40	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Viejo y A. de Mierdanchel hasta E. Buendía
Código	ES030MSPF0141010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
41	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Escabas desde R. Trabaque hasta R. Guadiela
Código	ES030MSPF0142010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
42	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Escabas desde su nacimiento hasta R.Trabaque
Código	ES030MSPF0143010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
43	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Trabaque desde su nacimiento hasta R.Escabas
Código	ES030MSPF0144010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
44	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Cuervo aguas abajo de E. de La Tosca
Código	ES030MSPF0145011

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,06	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,05	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,01	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,22	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
45	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Tosca, La
Código	ES030MSPF0146020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,08	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,06	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,25	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
46	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Cuervo hasta el E. la Tosca
Código	ES030MSPF0147010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,04	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
47	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Laguna Grande de El Tobar
Código	ES030MSPF0148040

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,04	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
48	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Laguna de Taravilla o de La Parra
Código	ES030MSPF0149040

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
49	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajuña desde R. Ungria hasta R.Jarama
Código	ES030MSPF0201010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,34	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,72	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,04	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,10	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,44	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,38	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
50	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajuña desde E.Tajera hasta R.Ungria
Código	ES030MSPF0202011

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,60	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,86	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,60	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
51	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Tajera, La
Código	ES030MSPF0203020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,91	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,32	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
52	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajuña hasta E. de la Tajera
Código	ES030MSPF0204010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,58	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,62	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
53	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Ungria hasta su confluencia con R.Tajuña
Código	ES030MSPF0205010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,04	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
54	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río San Andrés hasta R.Tajuña
Código	ES030MSPF0206010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
55	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Barranco del Reato hasta el E.La Tajera
Código	ES030MSPF0207010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
56	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Henares desde Río Torote hasta Río Jarama
Código	ES030MSPF0301010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,56	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,67	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,46	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,16	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,83	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,56	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
57	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Henares desde Arroyo del Sotillo hasta Río Torote
Código	ES030MSPF0302010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,59	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,32	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,20	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,16	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,78	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,14	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
58	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Henares desde Río Badiel hasta Arroyo del Sotillo
Código	ES030MSPF0303010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,62	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,14	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,13	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,88	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,90	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
59	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Henares desde Canal de Henares hasta Río Badiel
Código	ES030MSPF0304010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,69	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,80	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,70	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
60	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Henares desde Río Sorbe hasta Canal de Henares.
Código	ES030MSPF0305010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,69	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,07	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
61	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Henares desde Río Bornoba hasta Río Sorbe
Código	ES030MSPF0306010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,99	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,99	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,17	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,97	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,64	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
62	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Henares desde Río Cañamares hasta Río Bornoba
Código	ES030MSPF0307010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,60	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,70	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,07	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,56	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,89	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,78	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
63	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Henares desde Arroyo de la Vega hasta R.Cañamares
Código	ES030MSPF0308010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,47	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,39	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,69	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,26	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
64	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Henares desde R.Salado hasta Ayo. de la Vega
Código	ES030MSPF0309021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,83	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,17	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
65	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Henares hasta confluencia con Río Salado
Código	ES030MSPF0310010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,01	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,06	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
66	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS


Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Torote hasta R. Henares
Código	ES030MSPF0311010

RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,07	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,07	0	9
--	------	---	---

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
67	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de Camarmilla hasta R. Henares
Código	ES030MSPF0312010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,23	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,07	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,30	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
68	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de las Dueñas hasta su confluencia en el Henares
Código	ES030MSPF0313010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
69	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo del Majanar hasta su confluencia en el Henares
Código	ES030MSPF0314010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,06	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,09	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
70	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Badiel hasta su confluencia con el Río Henares
Código	ES030MSPF0315010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,06	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
71	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Sorbe desde E. de Beleña hasta Río Henares.
Código	ES030MSPF0316011

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,32	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,55	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,48	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
72	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Beleña
Código	ES030MSPF0317020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,33	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,59	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,56	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
73	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Sorbe hasta E. Beleña
Código	ES030MSPF0318010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
74	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de la Dehesa hasta río Sorbe
Código	ES030MSPF0319010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,08	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,09	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
75	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Bornoba desde E. Alcorlo hasta Río Henares
Código	ES030MSPF0320011

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,45	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,97	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
76	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Alcorlo
Código	ES030MSPF0321020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,56	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
77	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Bornova hasta E. de Alcorlo
Código	ES030MSPF0322010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
78	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Cañamares desde E. Palmaces hasta Río Henares
Código	ES030MSPF0323011

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,92	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,45	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,55	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
79	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Pálmaces
Código	ES030MSPF0324020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,49	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,04	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,79	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
80	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Cañamares hasta E. Palmaces
Código	ES030MSPF0325010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
81	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de la Vega hasta confluencia con Río Henares
Código	ES030MSPF0326010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
82	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS


Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Salado desde E. El Atance hasta R. Henares
Código	ES030MSPF0327021

RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,54	0	9
--	------	---	---

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
83	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Atance, El
Código	ES030MSPF0328020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,07	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,59	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
84	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Salado hasta E.de El Atance
Código	ES030MSPF0329010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,27	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,28	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
85	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Lagunas Grande de Beleña y Chica de Beleña
Código	ES030MSPF0330040


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
86	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Laguna de Somolinos
Código	ES030MSPF0331040

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
87	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Guadarrama desde Bargas hasta R. Tajo
Código	ES030MSPF0401010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,89	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,10	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,01	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,07	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,46	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
88	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS


Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Guadarrama desde R. Aulencia hasta Bargas
Código	ES030MSPF0402010

RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,99	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,21	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,25	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,97	0	9
--	------	---	---

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
89	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Guadarrama desde Galapagar hasta A. Batan
Código	ES030MSPF0403010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,11	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,10	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,34	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,13	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,86	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
90	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Guadarrama y Ayo de los Linos del Soto en Villalba
Código	ES030MSPF0404021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,13	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,13	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,48	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,37	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,30	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,60	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
91	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Guadarrama desde R. Navalmedio hasta Ayo. Loco
Código	ES030MSPF0405010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,04	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,05	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,25	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,25	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,32	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,97	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
92	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de Renales hasta R. Guadarrama
Código	ES030MSPF0406010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,43	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,51	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
93	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de los Combos
Código	ES030MSPF0407021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,51	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
1,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,07	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,57	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
94	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo del Soto
Código	ES030MSPF0408021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,82	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
1,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,82	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
95	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. del Batán desde E. Aulencia hasta R. Guadarrama
Código	ES030MSPF0409021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,23	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,12	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,86	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
96	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Aulencia
Código	ES030MSPF0410020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,23	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,73	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
97	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Valmayor
Código	ES030MSPF0411020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,14	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,64	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
98	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo del Batan hasta E.Valmayor
Código	ES030MSPF0412010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,02	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,20	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,68	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,39	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,34	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
99	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo del Plantío
Código	ES030MSPF0413021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,57	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
1,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,57	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
100	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de la Jarosa desde E. de la Jarosa
Código	ES030MSPF0414011

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,43	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,68	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,61	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,53	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
101	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Jarosa, La
Código	ES030MSPF0415020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,77	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,15	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
102	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS


Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Jarama desde Río Tajuña hasta Río Tajo
Código	ES030MSPF0416021

RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,84	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,18	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,68	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,05	0	9
--	------	---	---

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
103	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Jarama desde E. del Rey hasta Río Tajuña
Código	ES030MSPF0417021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,92	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,21	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,01	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,46	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
104	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Rey, Del
Código	ES030MSPF0418020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,92	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,39	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,74	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
105	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Jarama desde Río Henares hasta E. del Rey
Código	ES030MSPF0419010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,92	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,27	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,26	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,96	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,81	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
106	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Jarama desde A. Valdebebas hasta R.Henares
Código	ES030MSPF0420021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
1,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,22	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,13	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,86	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
107	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Jarama desde Río Guadalix hasta Ayo. Valdebebas
Código	ES030MSPF0421021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,54	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,06	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,12	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
108	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Jarama desde Río Lozoya hasta Río Guadalix
Código	ES030MSPF0422021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,27	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,13	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,02	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,08	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
109	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Jarama en la confluencia con Río Lozoya
Código	ES030MSPF0423021


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,35	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,49	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,44	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
110	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Jarama aguas abajo del embalse de el Vado
Código	ES030MSPF0424021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,35	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,50	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,47	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
111	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Vado, El
Código	ES030MSPF0425020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,42	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,61	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,77	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
112	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Ríos Jarama hasta E. El Vado
Código	ES030MSPF0426010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
113	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Manzanares a su paso por Madrid
Código	ES030MSPF0427021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,98	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
1,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
1,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,06	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,88	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	6,40	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
114	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Manzanares desde E. El Pardo hasta Arroyo de la Trofa
Código	ES030MSPF0428021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,08	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,59	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
115	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Pardo, El
Código	ES030MSPF0429020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,08	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,58	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
116	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Manzanares desde E. Santillana hasta E. El Pardo
Código	ES030MSPF0430021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,10	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,60	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
117	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Santillana/ Manzanares El Real
Código	ES030MSPF0431020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,12	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,62	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
118	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Manzanares hasta el embalse de Santillana
Código	ES030MSPF0432010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,92	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,98	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
119	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de los Prados
Código	ES030MSPF0433021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,70	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
1,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,71	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
120	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo del Culebro
Código	ES030MSPF0434021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,72	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
1,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,75	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
121	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de la Zarzuela
Código	ES030MSPF0435021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,48	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,48	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
122	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de la Trofa
Código	ES030MSPF0436010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,02	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,23	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,47	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,55	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,31	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
123	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Navacerrada desde E. Navacerrada hasta E. Santillana
Código	ES030MSPF0437021


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,42	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,29	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,22	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,52	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
124	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Navacerrada
Código	ES030MSPF0438020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,38	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,13	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,70	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
125	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de Pantueña hasta el R.Jarama
Código	ES030MSPF0439010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,14	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,43	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,58	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
126	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de Viñuelas
Código	ES030MSPF0440021


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,19	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
1,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,20	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
127	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Guadalix desde E. El Vellón hasta Río Jarama
Código	ES030MSPF0441021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,71	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,52	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,19	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,06	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,96	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
128	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Vellón, El/Pedrezuela
Código	ES030MSPF0442020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,88	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,67	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,10	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,88	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
129	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Lozoya desde E. Atazar hasta Río Jarama
Código	ES030MSPF0443021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	6,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
130	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Atazar
Código	ES030MSPF0444020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,08	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,58	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
131	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Villar, El
Código	ES030MSPF0445020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,69	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,94	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
132	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Puentes Viejas
Código	ES030MSPF0446020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,61	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,76	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
133	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Riosequillo
Código	ES030MSPF0447020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,59	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,87	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,54	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
134	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Lozoya desde E. Pinilla hasta E. Ríosequillo.
Código	ES030MSPF0448021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,29	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,43	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,29	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
135	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Pinilla, La
Código	ES030MSPF0449020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,36	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,57	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,59	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
136	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Lozoya hasta E. Pinilla.
Código	ES030MSPF0450010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
137	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Ríos Riato y de la Puebla hasta el E. Atazar
Código	ES030MSPF0451010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
138	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Madarquillos hasta E. Puentes Viejas
Código	ES030MSPF0452010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,04	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
139	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de Canencia hasta su confluencia con el Lozoya
Código	ES030MSPF0453010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
140	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de Vallosera hasta E. Vado
Código	ES030MSPF0454010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
141	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Laguna Grande de Peñalara
Código	ES030MSPF0455040

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
142	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Laguna de los Pájaros
Código	ES030MSPF0456040


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
143	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Complejo lagunar de humedales temporales de Peñalara
Código	ES030MSPF0457040

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
144	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Alberche desde E. Cazalegas hasta R. Tajo
Código	ES030MSPF0501021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,75	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,48	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,11	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,09	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,41	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
145	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Cazalegas
Código	ES030MSPF0502020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,76	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,49	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,10	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,09	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,44	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
146	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Alberche desde A. del Molinillo hasta E. de Cazalegas
Código	ES030MSPF0503021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,75	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,48	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,05	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,31	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
147	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Alberche desde A. Tordillos hasta A. Molinillo
Código	ES030MSPF0504021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,82	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,50	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,49	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
148	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Alberche desde Río Perales hasta Ayo. Tordillos
Código	ES030MSPF0505021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,88	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,52	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,63	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
149	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Alberche desde E. Picadas hasta R, Perales
Código	ES030MSPF0506021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,98	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,57	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,07	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,38	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
150	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Picadas
Código	ES030MSPF0507020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,98	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,57	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,11	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,94	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
151	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	San Juan
Código	ES030MSPF0508020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,97	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,56	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,83	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
152	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Alberche desde E. Puente Nuevo hasta E. San Juan
Código	ES030MSPF0509021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,80	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,40	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,09	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,29	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
153	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Puente Nuevo
Código	ES030MSPF0510020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,84	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,41	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,33	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
154	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Burguillo, El
Código	ES030MSPF0511020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,84	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,40	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,29	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
155	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Alberche desde Gta Royal hasta el E. del Burguillo
Código	ES030MSPF0512010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
156	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Alberche desde R.Piquillo hasta Gta. Royal
Código	ES030MSPF0513010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
157	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Alberche hasta el Río Piquillo
Código	ES030MSPF0514010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
158	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A de Marigarcía hasta R. Alberche
Código	ES030MSPF0515010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,09	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,11	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
159	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. del Molinillo hasta R. Alberche
Código	ES030MSPF0516010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,07	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,08	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
160	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. Tordillos hasta R. Alberche
Código	ES030MSPF0517010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,08	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,08	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,17	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
161	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Perales hasta R. Alberche
Código	ES030MSPF0518010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,03	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,07	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,33	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,50	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
162	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Cabecera del Río Perales y afluentes
Código	ES030MSPF0519010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,06	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,03	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,10	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,17	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,83	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,26	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
163	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Cofio desde R. Sotillo hasta E. San Juan
Código	ES030MSPF0520010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,27	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,21	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,96	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,81	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
164	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS


Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Cofio desde Río de las Herreras hasta R. Sotillo
Código	ES030MSPF0521010

RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,41	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,29	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,06	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,39	0	9
--	------	---	---

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
165	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río de la Aceña desde E. de la Aceña hasta R. Cofio
Código	ES030MSPF0522011

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,35	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,57	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
166	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Aceña, La
Código	ES030MSPF0523020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,52	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
167	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Sotillo hasta confluencia con R. Becedas
Código	ES030MSPF0524010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,04	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,05	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,71	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,88	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
168	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Becedas hasta R. Sotillo
Código	ES030MSPF0525010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,05	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,03	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,99	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,17	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
169	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río de la Gaznata hasta el E.Burguillo
Código	ES030MSPF0526010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,03	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,09	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,19	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
170	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta de Iruelas y otros hasta E.de Burguillo
Código	ES030MSPF0527010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
171	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de Arredondo hasta E. Burguillo
Código	ES030MSPF0528010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,19	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,25	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
172	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de Chiquillo hasta su confluencia con el Río Alberche
Código	ES030MSPF0529010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
173	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Azután
Código	ES030MSPF0601020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,25	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,81	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
174	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo desde R. Alberche hasta la cola del E.Azután
Código	ES030MSPF0602021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,18	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,35	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,03	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
175	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Tajo en la confluencia con el R. Alberche
Código	ES030MSPF0603021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,08	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,46	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,04	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
176	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Tajo aguas abajo del E. Castrejón
Código	ES030MSPF0604021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,14	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,70	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
177	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Castrejón
Código	ES030MSPF0605020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,08	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,09	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,67	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
178	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Tajo desde confluencia del Guadarrama hasta E. Castrejón
Código	ES030MSPF0606021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,22	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,78	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
179	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tajo en Toledo, hasta confluencia del R.Guadarrama
Código	ES030MSPF0607021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,18	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,19	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,88	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
180	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Tajo desde Jarama hasta Toledo
Código	ES030MSPF0608021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,09	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,01	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,29	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,89	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
181	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Uso desde A. de San Vicente hasta E. de Azután
Código	ES030MSPF0609010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,03	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
182	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Gévalo desde A. de Balvedillo hasta E. Azután
Código	ES030MSPF0610011

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,09	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,06	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,96	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,27	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
183	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Presa del Río Gévalo
Código	ES030MSPF0611020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,10	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,10	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,36	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
184	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Gévalo hasta E. Gévalo
Código	ES030MSPF0612010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
185	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Sangrera y Fresnedoso hasta su confluencia con el Tajo
Código	ES030MSPF0613010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
186	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Pusa desde E. Pusa
Código	ES030MSPF0614010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,12	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,47	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,66	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
187	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Pusa hasta E. Pusa
Código	ES030MSPF0615010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,02	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,04	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,10	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
188	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Cedena hasta su confluencia con el Tajo
Código	ES030MSPF0616010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,05	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,07	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
189	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. del Torcón desde E. del Torcón hasta R. Tajo
Código	ES030MSPF0617011

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,27	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,12	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,04	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,77	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
190	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Torcón
Código	ES030MSPF0618020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,31	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,15	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,85	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
191	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de las Cuevas hasta R. Tajo
Código	ES030MSPF0619010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,07	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
192	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de Guajaráz desde E. Guajaráz hasta R. Tajo
Código	ES030MSPF0620021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,09	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,05	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,64	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
193	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Guajaraz
Código	ES030MSPF0621020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,65	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,84	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
194	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Algodor desde E. del Castro hasta R. Tajo
Código	ES030MSPF0622021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,07	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,58	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
195	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Castro, El
Código	ES030MSPF0623020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,52	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
196	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Algodor desde E. Finisterre hasta E. del Castro
Código	ES030MSPF0624021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,56	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
197	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Finisterre
Código	ES030MSPF0625020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,51	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
198	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Algodor desde A. Bracea hasta E. Finisterre
Código	ES030MSPF0626010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,06	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
199	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. Martín Román hasta confluencia con R. Tajo
Código	ES030MSPF0627010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,05	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,10	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
200	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de Guatén y Arroyo de Gansarinos
Código	ES030MSPF0628021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,25	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
1,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,06	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,81	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
201	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Canal de Castrejón
Código	ES030MSPF0629031


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,50	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
202	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Portiña, La
Código	ES030MSPF0630030

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,14	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,14	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
203	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Torrejón Tiétar
Código	ES030MSPF0701020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,12	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,13	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,08	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,52	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
204	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Tiétar desde A. Sta. María hasta E. Torrejón-Tiétar
Código	ES030MSPF0702021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,11	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,12	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,39	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,99	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,82	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
205	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Tiétar desde E. Rosarito hasta A. Sta María.
Código	ES030MSPF0703021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,15	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,14	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,92	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,97	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
206	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Rosarito
Código	ES030MSPF0704020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,24	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,18	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,11	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,86	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
207	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Tiétar desde R. Guadyerbas hasta E. Rosarito
Código	ES030MSPF0705010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,09	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,06	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,29	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
208	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Tiétar desde A. Herradón hasta R. Guadyerbas
Código	ES030MSPF0706010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,04	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,35	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,44	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
209	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Tiétar desde A. del Cuadro hasta A. del Herradón
Código	ES030MSPF0707010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,47	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,53	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
210	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta del Pajarero y R. Tiétar desde la Garganta
Código	ES030MSPF0708010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,02	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,02	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,18	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,29	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
211	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS


Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Ayo. Calzones y otros hasta E. Torrejón-Tiétar
Código	ES030MSPF0709010

RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,12	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,06	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,45	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,82	0	9
--	------	---	---

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
212	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. Porquerizo desde A. del Puente Mocho hasta R. Tiétar
Código	ES030MSPF0710010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,11	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,05	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,10	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,04	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,45	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
213	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de la Gargüera hasta R.Tiétar
Código	ES030MSPF0711010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,06	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,18	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,05	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,45	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
214	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta Jaranda
Código	ES030MSPF0712010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,04	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,02	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,17	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,08	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,41	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
215	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Ggts. Mayor, San Gregario y Cascarones
Código	ES030MSPF0713010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,02	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,12	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,23	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
216	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de Casas y A. de Don Blasco y Quebrada de los Trigales
Código	ES030MSPF0714010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,07	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,39	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,16	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,63	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
217	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo del Monte hasta R.Tiétar
Código	ES030MSPF0715010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,33	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,11	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,33	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,18	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
218	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de Santa María desde A. de Fresnedoso hasta R. Tiétar
Código	ES030MSPF0716010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,93	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,97	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
219	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de Toril y afluentes hasta Ayo. de Santa María
Código	ES030MSPF0717010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,20	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,23	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
220	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de Fresnedoso y afluentes hasta Ayo. de Santa María
Código	ES030MSPF0718010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,17	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,22	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
221	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta de Cuartos hasta R. Tiétar
Código	ES030MSPF0719010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,05	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,08	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
222	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Moros hasta el R.Tiétar
Código	ES030MSPF0720010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,41	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,45	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
223	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo Carcaboso hasta el R.Tiétar
Código	ES030MSPF0721010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,85	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,89	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
224	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta de Gualtaminos hasta R.Tiétar
Código	ES030MSPF0722010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,04	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,49	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,57	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
225	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. del Molinillo y otros hasta R.Tiétar
Código	ES030MSPF0723010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,12	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,16	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
226	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta de Minchones hasta R.Tiétar
Código	ES030MSPF0724010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,04	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,06	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
227	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta de Chilla y Garganta de Alardos hasta Tiétar
Código	ES030MSPF0725010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,04	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
228	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Garganta de Santa María hasta E. Rosarito
Código	ES030MSPF0726010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
229	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Arbillas hasta E. Rosarito
Código	ES030MSPF0727010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
230	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Guadyerbas desde E. Navalcan hasta R. Tiétar
Código	ES030MSPF0728011


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,30	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,47	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
231	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Navalcán
Código	ES030MSPF0729020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,50	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,31	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,52	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
232	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Guadyerbas desde A. de la Concha hasta E. Navalcan
Código	ES030MSPF0730010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,05	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,03	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,19	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
233	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Arenal desde R. de Cantos hasta R. Tiétar
Código	ES030MSPF0731010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,05	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,20	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,30	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
234	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. de Ramacastañas
Código	ES030MSPF0732010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,11	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,14	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
235	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta de Lanzahíta
Código	ES030MSPF0733010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,07	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,59	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
236	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta de las Torres hasta R.Tiétar
Código	ES030MSPF0734010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
237	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Ggta. Torinas desde A. de la Tejada hasta R. Tiétar
Código	ES030MSPF0735010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
238	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de la Aliseda hasta Garganta Torimas
Código	ES030MSPF0736010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
239	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Pajarero, El
Código	ES030MSPF0737020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,15	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,36	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
240	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Arrago desde Ayo. Patana hasta E. Alcántara II
Código	ES030MSPF0801021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,50	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,42	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,05	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,71	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
241	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Arrago desde E. Borbollón hasta Ayo. Patana
Código	ES030MSPF0802021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,70	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,47	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,99	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,63	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
242	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Borbollón
Código	ES030MSPF0803020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,78	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,50	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,34	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
243	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Arrágo hasta E. Borbollón
Código	ES030MSPF0804010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,04	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
244	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Rivera de Gata desde E. Rivera de Gata hasta R. Arrago
Código	ES030MSPF0805021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,39	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,28	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,03	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,65	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,81	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,23	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
245	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Rivera de Gata
Código	ES030MSPF0806020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,64	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,50	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,06	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
246	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Rivera de Gata hasta E. Rivera de Gata
Código	ES030MSPF0807010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,06	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
247	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Rivera del Acebo hasta E. Rivera de Gata
Código	ES030MSPF0808010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,03	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,25	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,36	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
248	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de Patana y otros hasta R. Árrago
Código	ES030MSPF0809010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,28	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,30	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
249	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Traigas hasta R. Árrago
Código	ES030MSPF0810010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
250	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Alagón desde R. Jerte hasta E. Alcántara.
Código	ES030MSPF0901010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,92	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,07	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
1,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	5,41	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
251	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Alagón desde E. Valdeobispo hasta el R. Jerte
Código	ES030MSPF0902021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,07	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
1,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	7,07	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
252	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Valdeobispo
Código	ES030MSPF0903020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,52	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
253	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Guijo de Granadilla
Código	ES030MSPF0904020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,54	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
254	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Gabriel y Galán
Código	ES030MSPF0905020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,51	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
255	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Alagón desde A. del Puentecillo hasta E. Gabriel y Galán
Código	ES030MSPF0906010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
256	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo Grande hasta R. Alagón
Código	ES030MSPF0907010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,02	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,82	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,04	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,95	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
257	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo CECIM hasta R. Alagón
Código	ES030MSPF0908010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,07	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,30	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,37	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
258	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Rivera de Hoguera hasta R. Alagón
Código	ES030MSPF0909010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,69	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,75	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
259	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo del Boquerón del Rivero aguas abajo del embalse de El Boquerón
Código	ES030MSPF0910010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,06	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,70	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,76	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
260	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo del Boquerón del Rivero hasta el embalse de El Boquerón
Código	ES030MSPF0911010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,07	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,07	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
261	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de las Monjas hasta R. Alagón
Código	ES030MSPF0912010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,32	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,02	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,41	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
262	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Jerte desde Gta.Oliva hasta R. Alagón.
Código	ES030MSPF0913010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,22	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,18	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,08	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,99	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,77	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
263	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Jerte aguas abajo del E. Jerte-Plasencia hasta Gta. Oliva
Código	ES030MSPF0914021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,26	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,22	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,23	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,04	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,64	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
264	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Jerte
Código	ES030MSPF0915020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,28	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,23	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,91	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
265	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Jerte desde Gta. del Infierno hasta E. Jerte-Plasencia
Código	ES030MSPF0916010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
266	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Cabecera del Jerte y Garganta de los Infernos
Código	ES030MSPF0917010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
267	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta de Oliva y otros, hasta R. Jerte
Código	ES030MSPF0918010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,15	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,21	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,43	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
268	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Rvra. del Bronco y Ayo. de los Jarales, hasta R. Alagón
Código	ES030MSPF0919010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,05	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
269	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Ambroz y otros hasta E. Valdeobispo
Código	ES030MSPF0920010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,73	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,86	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,09	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,78	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,66	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
270	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Los Ángeles desde R. Esperaban hasta E.Gabriel y Galán
Código	ES030MSPF0921010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,20	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,27	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
271	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Hurdano desde R. Malvellido hasta E. Gabriel y Galán
Código	ES030MSPF0922010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,03	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,19	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,25	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
272	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Ladrillar hasta el E. Gabriel y Galán
Código	ES030MSPF0923010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
273	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Cuerpo de Hombre tramo piscícola
Código	ES030MSPF0924010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,37	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,39	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
274	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Cuerpo de Hombre a su paso por Béjar
Código	ES030MSPF0925010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
1,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,08	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,10	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,59	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,29	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
275	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Cuerpo de Hombre aguas arriba de Béjar
Código	ES030MSPF0926010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
276	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Francia desde A. del Caserito
Código	ES030MSPF0927010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,04	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
277	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Ahigal
Código	ES030MSPF0928030

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
278	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Baños
Código	ES030MSPF0929030

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,09	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,09	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
279	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Navamuño
Código	ES030MSPF0930030

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
280	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS


Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Cedillo
Código	ES030MSPF1001020

RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,50	0	9
--	------	---	---

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
281	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Alcántara II
Código	ES030MSPF1002020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,05	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,58	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
282	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Torrejón Tajo
Código	ES030MSPF1003020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,53	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
283	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Valdecañas
Código	ES030MSPF1004020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,52	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
284	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Tajo desde E. Azután hasta E. Valdecañas
Código	ES030MSPF1005021


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,26	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	4,81	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
285	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Erjas desde pto Frontera hasta E. Cedillo
Código	ES030MSPF1006010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,05	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,06	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
286	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Erjas medio entre ptos. frontera (PT05TEJO864)
Código	ES030MSPF1007010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,05	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,06	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
287	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Erjas entre ptos. frontera (PT05TEJO786)
Código	ES030MSPF1008010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,08	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,09	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
288	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Erjas cabecera (PT05TEJO779)
Código	ES030MSPF1009010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
289	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Rivera Trevejana hasta R. Erjas
Código	ES030MSPF1010010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,02	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,29	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,35	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
290	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. de la Vega hasta R. Erjas
Código	ES030MSPF1011010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,03	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
291	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Ribera de Fresnedosa desde E. Portaje hasta E. Alcántara
Código	ES030MSPF1012021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,67	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,78	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,79	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
292	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Portaje
Código	ES030MSPF1013020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,53	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
293	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Guadiloba desde A. de la Rivera hasta E.Alcantara
Código	ES030MSPF1014021


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,82	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,25	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,12	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,12	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
294	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Guadiloba desde E. Guadiloba hasta A. de la Rivera.
Código	ES030MSPF1015021

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,32	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,35	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,05	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,89	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
295	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	A. de la Vid hasta E. Alcántara
Código	ES030MSPF1016010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,07	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,18	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
296	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de Barbaón y otros hasta E. Alcántara
Código	ES030MSPF1017010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,02	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
297	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo - Arrocampo
Código	ES030MSPF1018020


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,09	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,31	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
1,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,40	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
298	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Garganta de Descuernacabras hasta E. de Torrejón-Tajo
Código	ES030MSPF1019010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
299	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Ibor desde R. Pinarejo
Código	ES030MSPF1020010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,04	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
300	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Gualija hasta E. Valdecañas
Código	ES030MSPF1021010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
1,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	3,51	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
301	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Salor desde R. Ayuela hasta E. Cedillo
Código	ES030MSPF1022010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,12	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,07	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,30	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,66	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
302	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Salor desde E. Salor hasta R. Ayuela
Código	ES030MSPF1023011

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,37	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,20	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,05	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,06	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,78	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	1,93	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada pueden tener un déficit de sedimentos moderado o alto, ya que la mayor parte de los sedimentos se generan en la cabecera de los cauces, en general, regulados por embalses

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
303	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Salor
Código	ES030MSPF1024020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,76	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,33	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,07	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
304	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Ayuela desde E. de Ayuela hasta R.Salor y Ayo. Santiago
Código	ES030MSPF1025010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,04	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,27	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,41	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
305	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Ayuela
Código	ES030MSPF1026020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,33	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,05	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,77	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
306	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Aldea del Cano
Código	ES030MSPF1027020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,08	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,03	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,21	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
307	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Río Sever desde pto. fronterizo a E. Cedillo. PT05TEJO0905
Código	ES030MSPF1028010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,02	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,04	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,10	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
308	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Sever de cabecera a punto fronterizo. PT05TEJO0918
Código	ES030MSPF1029010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,03	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,04	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,13	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
309	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Alburrel desde Rivera Avid hasta R. Sever
Código	ES030MSPF1030010


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,05	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,04	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,23	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
310	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Alburrel tramo alto hasta Rivera Avid
Código	ES030MSPF1031010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,09	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,06	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,06	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,02	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,05	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,42	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
311	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Regato de Aurela hasta Cedillo
Código	ES030MSPF1032010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
312	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Rivera Carbajo hasta E. Cedillo
Código	ES030MSPF1033010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
313	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Rivera Calatrucha hasta E. Cedillo
Código	ES030MSPF1034010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
314	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Almonte desde R. Garciaz hasta E. Alcántara
Código	ES030MSPF1035010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,02	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,05	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,10	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
315	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Cabecera del Río Almonte
Código	ES030MSPF1036010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,03	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,02	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,13	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,22	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
316	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Tozo desde Ggta. Charco de las Carretas hasta R.Almonte
Código	ES030MSPF1037010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,02	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,04	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,06	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
317	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Gibranzos y Tamuja desde R. Sta.Maria hasta E. Alcántara
Código	ES030MSPF1038010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,02	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,01	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,03	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,11	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
318	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	R. Magasca desde A. Matacordero hasta R. Gibranzos
Código	ES030MSPF1039010

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,01	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,04	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,04	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,04	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,14	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
319	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Guadiloba
Código	ES030MSPF1040020

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
1,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,40	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,03	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,01	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	2,64	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
320	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Casar de Cáceres
Código	ES030MSPF1041030


RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,17	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,17	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
321	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Arroyo de la Luz
Código	ES030MSPF1042030

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,01	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,01	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
322	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Petit I
Código	ES030MSPF1043030

RESULTADOS


INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa



Ficha	CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
323	GRADO DE POTENCIAL ALTERACIÓN: CAUDALES LÍQUIDOS E HIDRODINÁMICA Y CAUDALES SÓLIDOS

Nombre masa de agua superficial PHT 2015-2021	Alcuéscar
Código	ES030MSPF1044030

RESULTADOS

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA			ALTO	MODERADO	BAJO	MUY BAJO
VALOR	CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
0,00	ICAH 1	Alteración de las aportaciones (embalses)				
0,00	ICAH 2	Laminación de avenidas (embalses)				
0,00	ICAH 3	Hidrópicos (centrales hidroeléctricas)				
0,00	ICAH 4	Impermeabilización del suelo				
0,00	ICAH 5	Vertidos de EDAR > 10,000 hab-eq				
0,00	ICAH 6	Derivaciones y retornos por regadíos				
0,00	Sólidos GP	Déficit de sedimentos por grandes presas				

VALOR DEL ÍNDICE GLOBAL DE ALTERACIÓN (de 0 a 9)	0,00	0	9
--	------	---	---

Máxima
alteración

INDICADORES DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA		CONCLUSIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	
ICAH 1	Alteración de aportaciones por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial para regular más del 30% de las aportaciones naturales correspondientes a la sección de cierre de la masa de agua.
ICAH 2	Laminación de avenidas por embalses	Los embalses existentes en la cuenca NO tardarían más de 5 días en llenarse (alta capacidad de laminación) si estuviese circulando de manera constante el Q T10 años.
ICAH 3	Hidrópicos por centrales hidroeléctricas	Las centrales hidroeléctricas existentes en la cuenca NO tienen capacidad potencial de generar hidrópicos significativos.
ICAH 4	Impermeabilización del suelo	La superficie impermeabilizada existente en la cuenca NO tiene una alta capacidad potencial de incrementar la escorrentía.
ICAH 5	Vertidos EDAR > 10,000 hab-eq	Los vertidos de las EDAR de >10.000 hab-eq existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de alteración de la magnitud y estacionalidad de los caudales.
ICAH 6	Derivaciones y retornos de regadíos	Los retornos de regadío existentes en la cuenca NO tienen una alta capacidad potencial de afectar a la magnitud y estacionalidad de los caudales.
GP	Déficit de sedimentos por grandes presas	La masa de agua asociada tendrá un déficit de sedimentos limitado

Grado de potencial alteración del régimen hidrológico de la masa

